

EMA APRUEBA NUEVA INDICACIÓN PARA LA EMPAGLIFLOZINA

Autor: Marcos García Aguado

Fecha de publicación: 23/05/2021

Patología: Insuficiencia cardiaca / Categoría: Novedades

Tiempo de lectura: 1 minutos

<https://www.carprimaria.com/leer-insuficiencia/empagliflozina-insuficiencia-cardiaca-ema>



La agencia europea del medicamento (EMA) ha aprobado una nueva indicación para la empagliflozina. Se aprueba su uso en insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida en pacientes diabéticos y no diabéticos, con un filtrado glomerular hasta 20 ml/h.

Se recoge la indicación tras los resultados del estudio de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (ICFEr) EMPEROR-reduced. En este estudio la empagliflozina, tanto en población diabética como no diabética, reducía de forma significativa la morbimortalidad de la población con ICFEr.

Actualmente la ICFEr dispone de fármacos con mejora pronóstica. No olvidemos que la ICFEr presenta una alta mortalidad, en España, fuera del periodo COVID-19, constituye la 4ª causa de muerte.

Los fármacos indicados para la ICFEr para mejora pronóstica, y que deben estar en la terapia de nuestros pacientes, son:

- Sacubitrilo/valsartan ó IECAS/ARA II
- Betabloqueantes
- Bloqueantes de los mineralocorticoides
- Inhibidores de SGLT-2 (dapagliflozina o empagliflozina)



Ilustración 1. Nueva indicación para la empagliflozina

REFERENCIAS

<https://www.ema.europa.eu/en>